

LE SAVIEZ-VOUS ?



SANTÉ DE LA FEMME : CANCER DU SEIN

Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il se soigne facilement, et plus les chances de guérison sont élevées.

On observe 99 % de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce et seulement 26 % pour un cancer diagnostiqué à un stade tardif. Il est donc essentiel de faire les mammographies de dépistage, même en l'absence de tout symptôme !

source : ameli.fr

Ensemble nous pouvons agir !

Rejoignez-nous sur :



 www.preventioncgss971.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?



SANTÉ DE LA FEMME : CANCER COLORECTAL

Plusieurs facteurs augmentent le risque d'avoir un cancer colorectal. Ce risque s'accroît lorsqu'on cumule plusieurs des facteurs de risque suivants :

- **L'âge** : le risque de cancer colorectal augmente après 50 ans;
- **Le mode de vie** ;
- **Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin** ;
- **L'hérédité.**

source : ameli.fr

Ensemble nous pouvons agir !

Rejoignez-nous sur :



 www.preventioncgss971.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?



SANTÉ DE LA FEMME : CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent des cancers féminins.

Près d'une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie.

Dès l'âge de 25 ans et en l'absence de symptômes, un examen clinique des seins par un médecin, une fois par an, est recommandé.

source : ameli.fr

Ensemble nous pouvons agir !

Rejoignez-nous sur :



 www.preventioncgss971.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?



SANTÉ DE LA FEMME : CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

La vaccination contre les papillomavirus humains en prévention du cancer du col de l'utérus ne protège pas contre toutes les infections à papillomavirus. C'est pourquoi il est nécessaire, chez les femmes de **25 à 65 ans**, même si elles sont vaccinées, de faire des frottis de dépistage tous les **3 ans** (après 2 premiers frottis normaux pratiqués à un an d'intervalle).

source : ameli.fr

Ensemble nous pouvons agir !

Rejoignez-nous sur :



 www.preventioncgss971.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?



SANTÉ DE LA FEMME : CANCER COLORECTAL

Le cancer colorectal fait suite dans 60 à 80 % des cas à une tumeur bénigne, appelée communément polype de type adénomateux ou festonné. Le processus de transformation d'un polype en cancer est de 5 à 10 ans.

Grâce au dépistage et à l'amélioration des traitements, la mortalité décroît. En effet, plus un cancer est diagnostiqué tôt, mieux il se soigne, et plus les chances de survie sont importantes.

source : ameli.fr

Ensemble nous pouvons agir !

Rejoignez-nous sur :



 www.preventioncgss971.fr